



GEL CAFARDS

Imidaclopride (CAS: 138261-41-3) 2,15% m/m, S-méthoprène (CAS: 65733-16-6) 0,5% m/m, OIT (CAS: 26530-20-1) 0,04% m/m

Utilisation

Blat'CLAC® Gel est un insecticide et un régulateur de croissance contre les blattes (*Blattella orientalis*, *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*). L'imidaclopride tue les cafards en 2-3 semaines. De plus, le S-méthoprène provoque l'infertilité chez les femelles et les nymphes, de sorte qu'elles ne peuvent pas se reproduire ou devenir des adultes reproducteurs. L'appât est attrayant pour les cafards même après 4 ans de stockage.

Méthode d'application

Application de manière ciblée d'appât par gouttes de gel dans des crevasses et fissures à l'aide d'une seringue. Application à l'intérieur de bâtiments commerciaux et d'habitation dans les fissures et les crevasses.

Dose : 1 goutte = 0,04g

Fréquence d'application lors d'un traitement: 1 application. Ne réappliquer le produit qu'une seule fois si l'infestation persiste après 2 semaines.

Fréquence de traitement: 3 mois après la fin de l'infestation, le traitement peut être répété. Maximum 6 applications par an.

Espèce	Faible infestation	Forte infestation
Blatte germanique (<i>Blattella germanica</i>)	0,12 g/m ² (3 gouttes)	0,16 g/m ² (4 gouttes)
Blatte orientale (<i>Blattella orientalis</i>)	0,16 g/m ² (4 gouttes)	0,24 g/m ² (6 gouttes)
Blatte américaine (<i>Periplaneta americana</i>)	0,16 g/m ² (4 gouttes)	0,24 g/m ² (6 gouttes)

Précautions d'emploi

Ne pas appliquer le produit directement sur ou à proximité de denrées alimentaires, surfaces ou ustensiles qui pourraient être en contact avec des denrées ou des boissons destinées à la consommation (humaine ou animale) ou avec des animaux de rente. Ce produit doit être utilisé en alternance avec d'autres produits ne contenant pas la même substance active pour éviter l'émergence de populations résistantes.



SUPPORT

Gel

CIBLE

Cafards

USAGE

Grand public

LIEUX D'UTILISATION

Lieux de passage

RÉFÉRENCE(S)

IN-OIN-08007 : 12/carton