



INZECTO PIÈGE MOUSTIQUES

Perméthrine : 8,46 % m/m (29,95 mg par piège) n° CAS 52645-53-1
Pyriproxyfène : 12,09 % m/m (42,79 mg par piège) n° CAS 95737-68-1.
Tétraméthrine : 0,85 % m/m (2,99 mg par piège) n° CAS 7696-12-0.

Utilisation

Le piège moustiques CLAC a été conçu pour attirer les moustiques femelles afin d'y pondre leurs oeufs. En effet, la forme, la couleur, la présence d'eau et d'une source de nourriture offrent un environnement idéal pour la reproduction. Grâce au revêtement breveté situé à l'intérieur du piège, les femelles sont tuées par contact. En cas de ponte, l'ensemble des oeufs sont tués par le larvicide contenu dans l'eau au fond du piège.

Méthode d'application

Très simple d'utilisation, il suffit d'ajouter de l'eau dans le piège et de le placer à l'ombre. Pour une efficacité optimale, il est conseillé d'utiliser 2 pièges pour 200 m² et d'ajouter 1 piège par 200 m² additionnel.

1. Retirer le piège de son emballage
2. Remplir le piège avec de l'eau à température ambiante jusqu'au régulateur de niveau d'eau.
3. Placer le piège à l'extérieur, à l'ombre et à l'abri du vent soit posé sur une surface plane soit suspendu à un arbre ou à une autre structure. Eviter d'exposer le piège au soleil ou de le poser sur des surfaces chauffantes telles que le béton, les briques ou l'asphalte. Il est important de s'assurer que le piège soit maintenu en position verticale et qu'il reste de l'eau dans le piège. Si le niveau d'eau est faible, remplir à nouveau le piège jusqu'au régulateur de niveau d'eau.

Une fois ouvert, le piège offre 3 mois d'efficacité.

Précautions d'emploi

Conserver les pièges non ouverts dans un endroit frais et sec jusqu'à leur utilisation.

Ne pas stocker à proximité de nourriture.



SUPPORT

Piège insecticide

CIBLE

Moustiques

USAGE

Grand public

LIEUX D'UTILISATION

Extérieur à l'ombre et à l'abri du vent

RÉFÉRENCE(S)

IN-OIN-99018 : 6/carton